



Gouvernement du District de Columbia
Département de la Santé (DOH)



Division épidémiologie -surveillance des maladies & enquêtes
10 octobre 2014

Maladie à virus Ebola (MVE)

Algorithme d'évaluation des cas possibles de maladie à virus Ebola

EXPOSITION À RISQUE ÉLEVÉ*	SYMPTÔMES	PROCÉDURES
<p>Exposition par voie sous-cutanée (p. ex., piqûre d'aiguille) ou de muqueuses à du sang ou à des liquides biologiques d'un patient atteint de MVE</p> <p>OU</p> <p>Contact cutané direct ou exposition au sang ou liquides biologiques d'un patient atteint de MVE</p> <p>OU</p> <p>Manipulation du sang ou des liquides biologiques d'un patient atteint de MVE sans porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié ou sans prendre des mesures de biosûreté</p> <p>OU</p> <p>Contact direct avec un cadavre (y compris rites funéraires) dans une zone d'épidémie de MVE** sans porter un EPI approprié</p>	<p>FIÈVRE (subjective ou $\geq 101,5^{\circ}\text{F}$ ou $38,6^{\circ}\text{C}$)</p> <p>OU</p> <p>Symptômes évocateurs de MVE (céphalées, asthénie, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ou hémorragie)</p>	<p>TEST DE DÉPISTAGE DU VIRUS EBOLA INDIQUÉ</p> <p>Isoler le patient et utiliser les précautions d'usage et pour éviter les microgouttelettes et le contact</p> <p>Contactez immédiatement le DOH et soumettre un formulaire de signalement de maladie infectieuse</p> <p>DOH organisera le transport de l'échantillon et le test de dépistage dans un laboratoire de santé publique et au CDC</p> <p>En consultation avec le CDC, le DOH fournira des conseils à l'hôpital sur tous les aspects de soins et de prise en charge du patient</p> <p>Examiner le dossier avec le DOH pour :</p> <ul style="list-style-type: none">• Évaluer la sévérité de la maladie• Exclure les maladies endémiques (p. ex. typhoïde, paludisme)• Effectuer les autres tests de diagnostic nécessaires
	<p>PAS DE SYMPTÔMES</p>	<p>PROCÉDURES</p> <p>Contactez immédiatement le DOH et soumettre un formulaire de signalement de maladie infectieuse</p>

<p>EXPOSITION À RISQUE FAIBLE*</p> <p>Membres de la famille d'un patient atteint de MVE et tiers avec bref contact direct (p. ex. serrer la main) avec un patient atteint de MVE sans porter un EPI approprié</p> <p>OU</p> <p>Personnel médical dans les établissements avec des cas confirmés ou probables de patients atteints de MVE, dans la zone de soin pendant une période prolongée sans porter l'EPI recommandé</p> <p>OU</p> <p>Autre contact rapproché avec un patient atteint de MVE (dans le cadre de soins ou de la communauté)</p>	<p>SYMPTÔMES</p> <p>FIÈVRE (subjective ou $\geq 101,5^{\circ}\text{F}$ ou $38,6^{\circ}\text{C}$)</p> <p>OU</p> <p>Symptômes évocateurs de MVE (céphalées, asthénie, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ou hémorragie)</p>	<p>PROCÉDURES</p> <p>Isoler le patient et utiliser les précautions d'usage et pour éviter les microgouttelettes et le contact</p> <p>Contactez immédiatement le DOH et soumettre un formulaire de signalement de maladie infectieuse</p> <p>Examiner le dossier avec le DOH pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluer la sévérité de la maladie • Exclure les maladies endémiques (p. ex. typhoïde, paludisme) • Effectuer les autres tests de diagnostic nécessaires
	<p>PAS DE SYMPTÔMES</p>	<p>PROCÉDURES</p> <p>Contactez immédiatement le DOH et soumettre un formulaire de signalement de maladie infectieuse</p>
<p>AUCUNE EXPOSITION CONNUE*</p> <p>Personne qui s'est rendue dans une zone d'épidémie de MVE** mais sans exposition connue</p>	<p>SYMPTÔMES</p> <p>FIÈVRE (subjective ou $\geq 101,5^{\circ}\text{F}$ ou $38,6^{\circ}\text{C}$)</p> <p>OU</p> <p>Symptômes évocateurs de MVE (céphalées, asthénie, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ou hémorragie)</p>	<p>PROCÉDURES</p> <p>Isoler le patient et utiliser les précautions d'usage et pour éviter les microgouttelettes et le contact</p> <p>Contactez immédiatement le DOH et soumettre un formulaire de signalement de maladie infectieuse</p> <p>Examiner le dossier avec le DOH pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluer la sévérité de la maladie • Exclure les maladies endémiques (p. ex. typhoïde, paludisme) • Effectuer les autres tests de diagnostic nécessaires
	<p>PAS DE SYMPTÔMES</p>	<p>PROCÉDURES</p> <p>Auto-surveillance pendant 21 jours après la dernière exposition potentielle à la MVE</p> <p>Voir un médecin si une fièvre ou des signes cliniques évocateurs de la MVE apparaissent (voir « SYMPTÔMES »)</p>

* Cet algorithme du risque lié à l'exposition est uniquement à l'intention des personnes dont l'exposition potentielle à la MVE s'est produite au cours des 21 derniers jours. Les personnes ayant été potentiellement exposées à la MVE il y a plus de 21 jours ne sont pas considérées à risque, quelle que soit leur catégorie d'exposition au risque.

**** Sur la base des informations les plus récentes du CDC**