



哥伦比亚特区
卫生部



流行病处疾病监测和调查科 2014 年 11 月 3 日

埃博拉病 (EVD)

埃博拉病情评估指南

高风险*	症状	程序
<p>在埃博拉病患者有发病症状时通过皮下（如注射针头）或粘膜接触患者血液或体液</p> <p>或</p> <p>在埃博拉病患者有□病症状□未使用个人防护设备（PPE）即通过皮肤接触或直接接触患者血液或体液</p> <p>或</p> <p>在埃博拉病患者有发病症状时未采用适当的 PPE 或生物安全措施即处理患者血液或体液</p> <p>或</p> <p>在疫情国家未采用适当的 PPE 即直接接触患者尸体（包括在葬礼过程中）**</p> <p>或</p> <p>在埃博拉病患者有发病症状时与之同住一处并直接护理患者</p>	<p>发烧 (感觉或测量 $\geq 100.4^{\circ}\text{F}/38.0^{\circ}\text{C}$)</p> <p>或</p> <p>埃博拉病症状 (头剧痛、肌肉痛、呕吐、腹泻、胃痛或无法解释的出血或青紫)</p>	<p>进行埃博拉病检查</p> <p>迅速隔离患者</p> <p>立即与卫生部联系，提交 传染病报告表</p> <p>卫生部将把标本送交一个公共卫生实验室或联邦疾病防治中心（CDC）化验</p> <p>经与 CDC 磋商，卫生部将向医院提供指南，指导患者护理和管理的各个方面</p> <p>与卫生部讨论病例，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 病情的严重程度• 排除地方性流行病（如伤寒、疟疾）• 进行其他适当的诊断性检查
	<p>无症状</p>	<p>程序</p> <p>立即与卫生部联系，提交 传染病报告表</p>

<p>中等风险*</p> <p>在埃博拉病患者有□病症状□在家中、医疗设施中或社区活动场所中与患者密切接触</p> <p>或</p> <p>在埃博拉疫情国家**：1) 在埃博拉病患者有□病症状□与患者直接接触，以及2) 在使用 PPE 的情况下有接触</p>	<p>症状</p> <p>□□ (感□或□量 ≥100.4°F/38.0°C)</p> <p>或</p> <p>埃博拉病症状 (□□痛、肌肉痛、呕吐、腹泻、胃痛或无法解□的出血或青紫)</p>	<p>程序</p> <p>迅速隔离患者</p> <p>立即与卫生部联系，提交传染病报告表</p> <p>与卫生部讨论病例，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 病情的严重程度 • 排除地方性流行病（如伤寒、疟疾） • 进行其他适当的诊断性检查
	<p>无症状</p>	<p>程序</p> <p>立即与卫生部联系，提交传染病报告表</p>
<p>低风险*</p> <p>曾在埃博拉疫情国家**，但没有已知接触</p> <p>在埃博拉病患者处于发病初期时未使用 PPE 即短暂直接接触患者（如握手）</p> <p>在埃博拉病患者有发病症状时在短时间内接近患者（如同在一个房间内）</p> <p>在没有埃博拉疫情的国家使用适当的 PPE 直接接触埃博拉病患者</p> <p>在埃博拉病患者有□病症状□与患者同乘一架飞机</p>	<p>症状</p> <p>□□ (感□或□量 ≥100.4°F/38.0°C)</p> <p>或</p> <p>呕吐、腹泻或无法解□的出血或青紫</p>	<p>程序</p> <p>迅速隔离患者</p> <p>立即与卫生部联系，提交传染病报告表</p> <p>与卫生部讨论病例，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 病情的严重程度 • 排除地方性流行病（如伤寒、疟疾） • 进行其他适当的诊断性检查
	<p>无症状</p>	<p>程序</p> <p>立即与卫生部联系，提交传染病报告表</p>

无可辨识风险*	症状	程序
接触过一位曾经接触埃博拉病患者但没有症状的人士	任何	根据需要对病人进行普通医疗评估和管理
<p>在埃博拉病患者出现症状之前曾经与之接触</p> <p>超过 21 天之前曾在埃博拉病疫情国家**</p> <p>曾在埃博拉病疫情国家**但并无以上任何方式的接触</p>	无症状	<p>程序</p> <p>无须采取措施</p>

* 本接触风险评估指南仅适用于在过去 21 天内可能有过埃博拉接触经历的人员。如果可能的埃博拉接触经历发生于 21 天之前，则不被视作有风险人员，无论其接触风险属于哪一类。

** 基于最新 CDC 信息。